

Средства для лечения заболеваний почек

Наименование препарата	Лекарственная форма	Активные компаненты	Эффект	Показания	Противопоказания
Канефрон	Капли Таблетки	- Трава золототысячника - Корень любистока лекарственного - Листья розмарина обыкновенного	- Антибиотическое (бактерицидное) - Противовоспалительное - Улучшение диуреза (увеличение объема выделяемой мочи) - Укрепление стенок сосудов мочевого тракта	- Острые и хронические воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей (циститы, пиелонефриты) - Предоперационная подготовка и профилактика рецидивов инфекций мочеполовых органов - Симптоматическая терапия мочекаменной болезни (нефролитиаза), сопровождающейся болями и дискомфортом	- Повышенная чувствительность (аллергические реакции) к компонентам препарата - Тяжелые нарушения функций печени и почек - Возраст до 1 года (для капельной формы) - Период беременности и грудного вскармливания (рекомендуется проконсультироваться с врачом).
Фитолизин	Паста Капсулы	- Сгущенный экстракт смеси: травы золотарника, травы хвоща полевого, травы горца птичьего, корневищ пырея, шелухи лука, листьев березы, семян пажитника, корня петрушки, корня любистока - Масло: апельсина, шалфея, травы мяты перечной, сосны обыкновенной	- Обладает выраженным мочегонным действием - Способствует растворению мелких конкрементов (камней) в почках и мочевыводящих путях - Оказывает противовоспалительное воздействие - Помогает выводить песок и мелкие камни естественным путем - Стимулирует почечный кровоток и улучшает фильтрационную способность почек	- Начальные стадии нефролитиаза (образования камней в почках) - Лечение циститов и уретритов бактериального происхождения - Поддерживающая терапия при хронических заболеваниях почек - Профилактика образования новых камней после операции удаления крупных конкрементов	- Почечная недостаточность тяжелой степени - Наличие крупных конкрементов, препятствующих нормальному оттоку мочи - Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения - Гастрит с повышенной кислотностью - Непереносимость компонентов растительного происхождения
Цистон	Таблетки	- Цветки двуплодника стебелькового - Стебли камнеломки язычковой - Стебля марены сердцелистной - Корневища сыти пленчатой - Семена соломоцвета шероховатого - Части надземной оносмы прицветниковой - Экстракт целого растения пепельной верони - Селикат извести - Порошок мумие	- Размягчает и способствует выведению мелких кристаллов солей кальция и оксалатов из почек и мочевыводящих путей - Обладает антисептическим эффектом против бактерий, часто вызывающих инфекции мочевыделительной системы - Расслабляет гладкую мускулатуру мочевыводящей системы, уменьшая спазмы и боли - Восстанавливает нормальный pH мочи, предотвращая образование новых камней	- Хронические и острые инфекционные процессы в мочевыводящих путях (циститы, пиелонефриты) - Нефролитиаз (формирование песка и небольших камней в почках) - Диссоциация больших конкрементов после литотрипсии (разбивания камней ультразвуком) - Подготовка пациентов к хирургическому удалению камней	- Аллергия на любые составляющие препарата - Детский возраст до 12 лет - Нарушения функции почек тяжелой степени - Сердечно-сосудистые патологии тяжелого течения - Анемия средней и тяжёлой степени тяжести
Марена красильная	Экстракт	Марена красильная	- Мягкое разрыхляющее и рассасывающее действие на небольшие почечные камни и кальциевые отложения - Устраняет воспаления слизистой оболочки мочевыводящих путей - Нормализует уровень pH мочи, способствуя профилактике повторных образований камней - Обладает легким спазмолитическим действием, облегчая мочеиспускание - Стимулирует работу иммунной системы благодаря антиоксидантному действию флавоноидов	- Нефролитиаз (песок и мелкие камни в почках) - Хронический пиелонефрит и цистит - Постлитотрипсия (после дробления камней ультразвуком) - Микрогематурия (наличие крови в моче) - Болевой синдром, связанный с камнями в почках и мочевых путях	- Острая почечная недостаточность - Гидронефроз и гидроуретер - Крупные камни в почках, препятствующие свободному отхождению мочи - Аллергия на растение или входящие в состав компоненты - Дети младше 12 лет - Беременность и период кормления грудью (без консультации врача)
Уролесан	Капли Капсулы	- Масло: пихтовое, мяты перечной, касторовое - Спиртовой экстракт семян моркови дикой - Спиртовой экстракт шишек хмеля - Спиртовой экстракт травы душицы обыкновенной	- Диуретический (увеличивает выделение мочи) - Обезболивающее и спазмолитическое (расслабляет мышцы мочевыводящих путей) - Растворяет некоторые виды мочевых солей и препятствует образованию новых камней - Иммуностимулирующий и противовоспалительный эффекты - Способствует восстановлению нормального цвета и прозрачности мочи	- Первичная и вторичная дисметаболическая нефропатия (нарушения минерального обмена) - Нефролитиаз (пескообразование и малые камни в почках) - Пиелонефрит и другие воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей - Болевой синдром, вызванный движением камней и песком в почках - Боли и затруднения при мочеиспускании - Урологические осложнения после операций и травм	- Высокая чувствительность к любому из компонентов препарата - Желчекаменная болезнь в активной фазе - Заболевания желудочно-кишечного тракта в остром периоде (гастрит, язва) - Эпилепсия и судорожные состояния - Беременность и грудное вскармливание (строго под контролем врача) - Детский возраст до 18 лет
Уронекст	Саше	- D-манноза - Сap-Max (клюквенный фруктовый концентрат) - Клетчатка клюквенная - Масло семян клюквы - Колекальциферол	- Укрепляет защитные силы организма и повышает местный иммунитет слизистых оболочек мочевыводящих путей - Обеспечивает восстановление микрофлоры влагалища и мочевыводящего канала - Участвует в восстановлении нормальной структуры эпителия (слизистой оболочки) - Создает неблагоприятные условия для роста патогенных микроорганизмов - Регулирует обмен кальция и фосфора, снижая риск формирования камней в почках	- Частые рецидивы инфекций мочевыводящих путей (циститы, уретриты) - После антибиотикотерапии для восстановления нормальной флоры - Для профилактики повторного инфицирования после перенесённых воспалений - Риск развития постменопаузальных изменений в мочеполовой сфере - Женщины репродуктивного возраста с частыми эпизодами кандидоза и бактериального вагиноза	- Индивидуальная гиперчувствительность к составляющим препарат - Патологии печени и поджелудочной железы в стадии декомпенсации - Беременность и кормление грудью (необходимо проконсультироваться с врачом) - Пациентам с нарушениями всасывания сахаров (например, галактоземия) - Прием высоких доз витамина D (более 1000 ME ежедневно) противопоказан детям и подросткам до 18 лет