

# Средства от папиллом и бородавок

Препарат	Активные компоненты состава	Противопоказания	Механизм действия	Способ применения
Антипапиллом гель	Комплекс экстрактов бергамота, корицы, чабреца, чайного дерева, шалфея, сосны, кедр, чистотела	Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. При появлении раздражения или аллергических реакций немедленно прекратить использование	Активные компоненты геля разрушают структуру белков в клетках кожи. После разрушения верхнего слоя кожи происходит постепенное отторжение ороговевших тканей, включая папиллому. Некоторые компоненты обладают антисептическим эффектом, способствуя предотвращению инфекций. Затем формируется новый здоровый эпителий	Кожу вокруг проблемных мест смазать вазелином или жирным кремом. Нанести гель на самый кончик ороговевшего участка кожи. Через 1-2 дня начинается отшелушивание ороговевших участков кожи и на 3-5 день происходит очищение участков кожи. Более крупные ороговевшие участки кожи рекомендовано удалять повторно, не ранее чем через 3 дня после первого нанесения
Суперчистотел	Гидрокарбонат натрия, хлорид натрия, гиброокись натрия	Индивидуальная непереносимость компонентов	Щелочные компоненты разрушают ткани папилломы/бородавки, затем ороговевший покров отшелушивается	Пораженный участок распарить в теплой воде. Здоровую кожу вокруг обработать кремом. Нанести одну каплю жидкости на дефект. Черные точки указывают на процесс отмирания кожи, полное очищение займет 3-5 дней. Крупные дефекты могут требовать повторного нанесения
Вартокс	Карбамид (мочевина) 40%, глицирризиновая кислота	Индивидуальная непереносимость компонентов	Карбамид (мочевина) 40% размягчает ткань бородавки, а глицирризиновая кислота оказывает противовирусное действие, в том числе против вируса папилломы человека	Нанести крем-пасту на область бородавки толстым слоем, накрыть тонким слоем ваты и зафиксировать пластырем. Через 24 часа снять пластырь и удалить размягченную часть бородавки пемзой, промыть водой. Повторить процедуру 1–2 раза в зависимости от размера бородавки
Веррукацид	Фенол, метакрезол	Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам, родинки, высыпания, расположенные на красной кайме губ и слизистых оболочках, возраст до 7 лет	Фенол и метакрезол вызывают денатурацию белков в тканях новообразований. Это приводит к их разрушению и отмиранию. Постепенно отмершие ткани отслаиваются, оставляя после себя чистую поверхность кожи. После удаления новообразования начинается процесс заживления	С помощью специального аппликатора или ватного тампона нанести небольшое количество препарата на поверхность новообразования. Избегать попадания раствора на окружающие здоровые участки кожи. Для небольших образований достаточно одного нанесения. Если образование крупное, возможно потребуется повторить нанесение несколько раз с интервалом в 3-5 минут. Оставить раствор на коже на указанное в инструкции время (обычно около 10-15 минут). По истечении времени смыть остатки раствора тёплой водой и высушить кожу
Кераворт	Имиквимод	Аллергия на компоненты препарата, беременность и период грудного вскармливания, возраст до 18 лет, открытые раны или язвы на коже, тяжелые аутоиммунные заболевания, заболевания печени и почек в стадии декомпенсации, иммунодефицитные состояния, лечение другими препаратами, влияющими на иммунную систему, солнечные ожоги или фоточувствительность кожи	Действие основано на стимуляции иммунной системы организма для борьбы с аномальными клетками кожи. Имиквимод активирует иммунную систему, вызывая высвобождение цитокинов (интерфероны альфа, гамма и интерлейкины), которые помогают организму бороться с вирусами и другими патогенами, а также способствуют уничтожению атипичных клеток	Наносить тонким слоем на поражённые участки кожи три раза в неделю перед сном. Оставлять крем на коже нужно на ночь (около 8 часов), а утром смыть тёплой водой. Лечение обычно длится от 16 до 32 недель. Избегайте попадания крема на здоровые участки кожи, слизистые оболочки и глаза.
Клареол	Гидроксид натрия, акрилат/С 10-30 алкилакрилат кроссполимер, д-пантенол, деионизированная вода	Индивидуальная непереносимость компонентов, наличие открытых ран, язв или воспалительных процессов на коже. Беременность и период лактации, возраст до 12 лет. Применение на слизистых оболочках и вблизи глаз. Родимые пятна, меланомы и другие злокачественные новообразования	Активные вещества воздействуют на мертвые или пораженные клетки, просто отшелушивая их с поверхности кожи. Состав растворяет межклеточные связи, клеточные оболочки и отмершие участки отпадают	На очищенную и высушенную кожу нанести препарат, используя специальный аппликатор или ватный тампон, избегая попадания средства на здоровые участки кожи. Применять 1-2 раза в сутки, в зависимости от типа и размера новообразования. Длительность курса лечения определяется индивидуально и может составлять от нескольких дней до нескольких недель. После нанесения препарата дать ему высохнуть на воздухе. Избегать механического воздействия на обработанный участок кожи. Необходимо регулярно осматривать обработанные участки кожи. При появлении признаков раздражения или аллергии прекратить использование препарата и обратиться к врачу.
Колломак	Салициловая кислота, молочная кислота, полидоканол	Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 1 года, заболевания почек. Не следует наносить на родимые пятна, волосистые бородавки, бородавки в области гениталий или лица	Салициловая кислота проникает в верхние слои кожи и вызывает разрушение межклеточных связей в роговом слое эпидермиса. Это приводит к отшелушиванию ороговевших клеток и уменьшению толщины поражённого участка кожи. Салициловая кислота также оказывает противовоспалительный эффект, снижая воспаление и покраснение кожи. Кроме того, салициловая кислота обладает слабым антисептическим действием, помогая предотвратить инфекцию в местах применения	С помощью специального аппликатора или ватного тампона аккуратно нанести на поверхность новообразования, избегая попадания на окружающие здоровые участки кожи. Для небольших образований достаточно одного нанесения. Если образование крупное, возможно потребуется повторить нанесение несколько раз с интервалом в 3-5 минут. Оставить раствор на коже на указанное в инструкции время. По истечении времени смыть остатки раствора тёплой водой и высушить кожу

## Литература:

1. Электронный ресурс. – URL: [https://www.asna.ru/cards/antipapillom\\_gel\\_5ml\\_dve\\_linii\\_pkf\\_ooo.html](https://www.asna.ru/cards/antipapillom_gel_5ml_dve_linii_pkf_ooo.html) (дата обращения: 09.02.2025)
2. Электронный ресурс. – URL: <https://www.rlsnet.ru/taa/supercistotel-52017> (дата обращения: 09.02.2025)
3. Электронный ресурс. – URL: [https://www.asna.ru/cards/vartoks\\_krem-pasta\\_20ml\\_farmtek.html](https://www.asna.ru/cards/vartoks_krem-pasta_20ml_farmtek.html) (дата обращения: 09.02.2025)
4. Электронный ресурс. – URL: <https://www.rlsnet.ru/drugs/verrukacid-21436> (дата обращения: 09.02.2025)
5. Электронный ресурс. – URL: <https://www.rlsnet.ru/drugs/keravort-64767> (дата обращения: 09.02.2025)
6. Электронный ресурс. – URL: <https://www.rlsnet.ru/taa/klareol-miagkii-ocishhaiushhii-gel-eksfoliant-82335> (дата обращения: 09.02.2025)
7. Электронный ресурс. – URL: <https://www.rlsnet.ru/drugs/kollomak-14991> (дата обращения: 09.02.2025)